

# PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE OSELTAMIVIR

## CÓMO DIFERENCIAR RESFRIO DE INFLUENZA

SIGNOS Y SÍNTOMAS	INFLUENZA	RESFRIADO
Aparición de los síntomas	Abruptamente	Gradualmente
Fiebre	Habitual	Rara vez
Dolores	Habituales	Leves
Escalofríos	Bastante común	Poco común
Fatiga, debilidad	Habitual	A veces
Estornudo	A veces	Común
Congestión nasal	A veces	Común
Dolor de garganta	A veces	Común
Malestar en el pecho, tos	Común	De leve a moderado
Dolor de cabeza	Común	Rara vez

## ADMINISTRACION DE OSELTAMIVIR



PACIENTES AMBULATORIOS PEDIATRICOS Y ADULTOS



UNICAMENTE A PACIENTES QUE PERTENEZCAN A LOS GRUPOS DE RIESGO\* Y DENTRO DE LAS 48HS DE INCIADO LOS SINTOMAS (NEUMONIA O ETI)



LA DURACIÓN RECOMENDADA DEL TRATAMIENTO ES DE 5 DÍAS.

## GRUPOS DE RIESGO PARA INFLUENZA

Grupo 1: Enfermedades respiratorias: Enfermedad respiratoria crónica -Asma moderado y grave

Grupo 2: Enfermedades cardiacas

Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no hemato-oncologicas)

Grupo 4: Pacientes Oncohematológicos y trasplantados

Grupo 5: Otros

- Obesos con índice de masa corporal [IMC] mayor a 40
- Diabéticos
- Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses
- Retraso madurativo grave en menores de 18 años de vida.
- Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves.
- Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años.
- Convivientes de enfermos oncohematológicos.
- Convivientes de prematuros menores de 1500g.
- Embarazadas (en cualquier trimestre) y púerperas hasta las 2 semanas del parto

MINISTERIO DE SALUD – EDIFICIO PROYECCIÓN AL FUTURO PISO 2  
 AUTOPISTA SERRANIAS PUNTANAS KM. 783 - CP. 5700 – CIUDAD DE SAN LUIS – PROVINCIA DE SAN LUIS

MINISTERIO DE SALUD



GOBIERNO DE SAN LUIS

SAN LUIS NOS UNE